

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Notiziario fitosanitario Area Sarcidano

N. 22/2015

Valido dal 23/07 al 31/07/2015

Laore Sardegna - Sportello Unico Territoriale per l'area del Sarcidano

Isili via Grazia Deledda, 11 - tel. e fax 0782 800005, fax 0782 803254

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
www.sardegnaagricoltura.it **Info sul web**

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Chiusura grappolo **scalaPFP -- scalaBBCH 77**

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): Dove persistono attacchi di questo patogeno si consiglia di eseguire trattamenti a base di Quinoxifen, Spiroxamina, zolfo in polvere o micronizzato.

Considerate le alte temperature si suggerisce di eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Eliminare le femminelle e le foglie più vecchie "senza eccedere" in quanto ostacolano l'aerazione e l'ottimale distribuzione della miscela dei fitofarmaci sui grappoli che stanno internamente alla chioma.

Peronospora (Plasmopara viticola): E' stata rilevata la presenza della patologia sul grappolo dovuta all'omissione o ritardata esecuzione dei trattamenti indicati in precedenza, in tal caso si consiglia di eseguire urgentemente un trattamento con prodotti endoterapici come dimetomorph, Metalaxil, mandipromamide, ecc. associati a prodotti di copertura a base di sali di rame (idrossidi).



Olivo

Fase fenologica: Indurimento nocciolo **scalaPFP 6 (F) scalaBBCH 75**

Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae): Dalle osservazioni in campo, dai controlli nelle stazioni di monitoraggio e dall'esame al binoculare sui campioni di olive "varietà Pizze Carroga", non si segnalano attacchi.

Notizie

n.b. attenersi scrupolosamente, per ogni prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta.